Bovikalc®

Pienso complementario mineral de calcio

Descripción

Complemento de calcio para vacas indicado en situaciones de demanda incrementada de este mineral.

Características

Presentación en forma de bolo intrarruminal.

Con cobertura cérea protectora.

Aporta un doble sistema de liberación de calcio (instantánea y prolongada).

Beneficios

Rápido inicio de acción.

Efecto terapéutico prolongado.

Excelentes resultados clínicos.

Ventajas

Fácil administración.

Dosificación más precisa.

No precisa receta veterinaria.

Especies de destino

Vacas.

Uso

Especialmente indicado después del parto, cuando las necesidades de calcio son más elevadas como consecuencia del inicio de la lactación.

Modo de empleo

Administrar por vía oral, con ayuda del aplicador, 4 bolos por vaca:

- 1er bolo a los primeros signos del parto.
- 2º bolo inmediatamente después del parto.
- 3er bolo 10-14 horas después del parto.
- 4º bolo 24 horas después del parto.

Tiempo de espera

No precisa.

Presentación

4 x 190 g.

- Doble fuente de calcio
- Liberación inmediata y prolongada de calcio
- No precisa receta veterinaria

Boehringer Ingelheim

Ir al Índice

Bovikalc®

Pienso complementario mineral de calcio

Materias primas para la alimentación animal

Cloruro cálcico	58%
Sulfato cálcico	23%
Ricinoleato de gliceril-polietilenglicol (E484)	6%
Goma xantana (E415)	< 1%

Constituyentes analíticos

Cenizas brutas:	67%
Humedad:	30%
Mat. Grasas brutas:	3%
Calcio:	22%
Fósforo:	0%
Sodio:	0%
Magnesio:	0%

Propiedades

Bovikalc® es un complemento de calcio para vacas indicado en situaciones de demanda incrementada de este mineral. Bovikalc® está especialmente indicado después del parto, cuando las necesidades de calcio son más elevadas como consecuencia del inicio de la lactación.

Bovikalc® se presenta en forma de bolo recubierto, para facilitar su administración por vía oral. Su especial cobertura protege la mucosa de la garganta y esófago de posibles irritaciones que podrían ser causadas por el cloruro cálcico. Una vez en el rumen, la cobertura se disuelve en 15-30 minutos y el cloruro cálcico es instantáneamente liberado y asimilado, mientras que el sulfato cálcico proporciona una fuente de calcio adicional retardada.

Recomendaciones de administración

Administrar por vía oral, con ayuda del aplicador, 4 bolos por vaca:

- Primer bolo a los primeros signos del parto
- Segundo bolo inmediatamente después del parto
- Tercer bolo 10-14 horas después del parto
- Cuarto bolo 24 horas después del parto

Instrucciones de uso

1 Introducir el bolo en el aplicador, con el extremo redondeado hacia el exterior. Verificar que quede firmemente acoplado.

2 Sujetando por los ollares la mandíbula superior, mantener la cabeza de la vaca ligeramente inclinada hacia arriba y dirigida hacia el aplicador.

3 Introducir con suavidad el aplicador en el interior de la boca, hasta sobrepasar la base de la lengua.

4 Una vez el aplicador haya alcanzado el fondo de la cavidad oral, presionar el émbolo para liberar el bolo.

Conservación

Conservar por debajo de 30ºC, en lugar seco y al abrigo de la luz.

Presentación

Envases con 4 bolos de 190 g.

Reg. Nº: 24.445-CAT

Fabricante

Boehringer Ingelheim Danmark A/S
Reg No: 208-R854833
Dinamarca

Titular

Boehringer Ingelheim España, S.A.
C/ Prat de la Riba, s/n
Sector Turó de Can Matas
08173 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Boehringer Ingelheim España, S.A. - División Veterinaria
Prat de la Riba s/n - Sector Turó Can Matas - 08173 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
www.boehringer-ingelheim.es/veterinaria - Tel. 934 045 250 - Fax. 934 045 345

Ir al Índice